

CONSEILS DU MOIS

CHEVRES

Sur les secteurs où l'herbe est en pleine pousse vous pouvez réduire la teneur azotée de votre ration (surtout si les crottes sont molles) Par exemple baissez le concentré azoté en le compensant par de la céréale ou diminuez la distribution de luzerne (voire la supprimer en fonction de la durée de pâturage ; on estime sur prairie une durée de 10h nécessaire pour satisfaire 100% des besoins en grossier) ; Vous pouvez également mettre des »fibres « à disposition en chèvrerie (foin de graminée grossier ou très bonne paille) pour sécuriser la ration

Surveiller le parasitisme cause majeure de chûtes de lait

NOUVEAU : il n'est plus conseillé de vermifuger systématiquement tout le troupeau, désormais pour éviter des phénomènes de résistances des parasites il est préférable de traiter en ciblant les primipares et les fortes laitières ou si il y a déjà de fortes chûtes de lait et des pertes d'état vermifugez ces » animaux en souffrance « car ce sont potentiellement les plus excréteurs ; L'objectif étant de maintenir une population de parasites sensibles aux vermifuges, hébergés par les chèvres non traitées

CHEVRETTES

Si elles sont encore en bâtiment surveiller la coccidiose, faire des lots homogène d'élevage surtout si elles ne sont pas toutes sevrées (naissances tardives)

Contrôler leur poids pour vérifier leur bonne croissance, privilégier la distribution d'un très bon foin et limiter le concentré pour les inciter à manger du grossier et ainsi constituer un volume de panse pour en faire des ruminants adultes efficaces

Dans la mesure du possible les sortir sur des parcs leur étant réservés (pas parasités par les chèvres) ou sur parcours gardées avec le troupeau (elles sont mieux au grand air, s'habituent à pâturer et luttent mieux contre la coccidiose)

BOUCS

Ne les négligez pas, surtout si ils sont logés à part et ne sortent pas, éventuellement taillez les onglons.